


Что такое ретинобластома




Ретинобластома
Инфо

Ретинобластома – это злокачественная опухоль сетчатки глаза. Встречается, в основном, у маленьких детей – 90-95% случаев **в возрасте до 5 лет**.

Пик заболеваемости – 12-18 месяцев от рождения. Ежегодно в России ретинобластомой болеет **120-150 детей**.

Ретинобластома может быть односторонней, двусторонней (поражены оба глаза) и трилатеральной (поражение обоих глаз сочетается с опухолью шишковидной железы).



В 40 % случаев причиной заболевания является **генетическая мутация гена RB1**. Поэтому в группе риска дети, у которых в семье уже были случаи заболевания ретинобластомой.

Ретинобластома всегда требует срочного лечения!
Развиваясь стремительно, она может привести к потере глаза/глаз или зрения, а также угрожать жизни ребенка

Наиболее распространенные симптомы ретинобластомы у детей:




Лейкокория (белый зрачок)




Косоглазие




Изменение цвета радужки и размера глаза



Красный, болезненный или опухший глаз



Нет эффекта «красных глаз»



Ухудшение зрения



Подробнее
о симптомах

Любой из этих симптомов – повод для срочного обращения к врачу для проведения расширенного офтальмологического обследования.

Лейкокория – это белое, матовое пятнышко в области зрачка ребенка («кошачий глаз») – наиболее частый симптом ретинобластомы.

Лейкокорию можно заметить на фотографиях в виде белого пятна на зрачке одного или обоих глаз ребенка. Отсутствие эффекта «красных глаз» на фотографиях также может быть проявлением лейкокории.



Как выявить лейкокорью (свечение зрачка) с помощью фотографий?

В 80% случаях родители или члены семьи первыми замечают тревожные симптомы

1. Отберите несколько фотографий ребенка или сделайте новые (режим коррекции должен быть выключен, вспышка включена, а ребенок должен смотреть прямо в камеру)
2. Внимательно рассмотрите фотографии: проверьте, есть ли белое/матовое/жёлтое пятнышко на зрачках одного или двух глаз ребенка («кошачий глаз»)
3. Если вы заметили такое пятнышко, примите меры – срочно обратитесь к врачу-офтальмологу для проведения необходимых исследований

Если вы заметили хотя бы один симптом ретинобластомы, то:

1. Необходимо срочно направить ребенка к офтальмологу
2. Офтальмолог проводит полное исследование, которое включает в себя проверку глазного дна (офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом)
3. При подтверждении подозрения на ретинобластому необходимо срочно направить ребенка для дальнейшей диагностики и лечения в профильное медицинское учреждение



Федеральные
клиники

Время очень ценно!
Вовремя замеченные симптомы и начатое лечение может спасти не только зрение, но и жизнь ребенка!

Офтальмологические осмотры являются «золотым стандартом» для обнаружения ретинобластомы на ранних стадиях.

Поэтому все дети, особенно дети из группы риска, должны проходить профилактические осмотры у офтальмолога*:

- каждые 3 месяца в течение 1-го года: **в 0 мес., 3 мес., 6 мес., 9 мес. и 1 год**
- каждые 6 месяцев до достижения 7 лет

Осмотр у офтальмолога должен проводиться при широком зрачке и включать в себя проверку глазного дна (офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом).

** согласно Клиническим рекомендациям «Интраокулярная ретинобластома» количество профосмотров у офтальмолога должно быть больше, чем сейчас предусмотрено стандартными планами диспансеризации. Однако родители всегда могут настоять на проведении дополнительного профосмотра ребенка или сделать его на платной основе. Рекомендуем ссылаться на Клинические рекомендации «Интраокулярная ретинобластома» (ID KP71/1), которые утверждены Минздравом России*

Подробнее о ретинобластоме – на сайте РетинбластомаИнфо.рф